



Azithromycin (Zithromax®)

Cet antibiotique est administré par voie orale et est utilisé pour traiter : l'urétrite non gonococcique, la cervicite mucopurulente, la chlamydia et la gonorrhée.

Avisez le médecin ou l'infirmière / l'infirmière praticienne des situations suivantes si vous :

- êtes allergique à un antibiotique;
- allaitez;
- prenez des médicaments avez récemment reçu un vaccin typhoïdique ou le vaccin BCG;
- présentez un intervalle QT long à l'électrocardiogramme, ou vous avez une faible concentration sanguine de magnésium ou de potassium;
- souffrez de myasthénie;
- avez des antécédents de maladie hépatique ou rénale;

Effets secondaires possibles

- Nausées, vomissements ou diarrhée
- Douleurs abdominales ou perte d'appétit
- Démangeaisons ou pertes vaginales

Prise de ce médicament

- Prenez les quatre comprimés en même temps, en une seule dose.
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Ne partagez-pas votre médication.

Précautions à prendre après la prise de ce médicament

- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles durant les 7 jours suivant le traitement, même avec un condom.
- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités.
- Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris le médicament, vous devez retourner à la clinique pour recevoir un autre traitement. La consommation d'alcool peut augmenter le risque de vomissement
- Attendez au moins 2 heures avant de prendre des antiacides (Tums, Roloids, Maalox)
- Cherchez des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants après avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge.

Conservation

- Ce médicament est souvent administré en clinique. Il doit être conservé à la température ambiante et tenu hors de la portée des enfants et des animaux.

Pour plus de renseignements, appelez la clinique santé-sexualité 613-234-4641

