



Cefixime (Suprax®)

Cette médication est prise par la bouche pour traiter la gonorrhée.

Avisez le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière des situations suivantes :

- vous êtes allergique à un antibiotique;
- vous prenez des médicaments ou avez récemment reçu un vaccin typhoïdique ou le BCG;

Effets secondaires possibles

- Nausées, vomissements, diarrhée,
- maux d’estomac, brûlement d’estomac

Prise du médicament:

- Prenez une seule dose.
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.

Précautions à prendre après la prise de ce médicament:

- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles durant les 7 jours suivant le traitement, même avec un condom.
- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités
- Si vous vomissez durant l’heure suivant la prise de ce médicament. Veuillez retourner à la clinique pour recevoir un autre traitement. L’alcool augmente le risque de vomissement.
- Cherchez des soins médicaux d’urgence si vous souffrez des symptômes suivants après avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge

Conservation:

- Ce médicament est souvent administré en clinique. Il doit être conservé à la température ambiante et tenu hors de la portée des enfants et des animaux.

Pour plus de renseignements, appelez la clinique santé-sexualité 613-234-4641

