



Ceftriaxone

Cet antibiotique est injecté dans la hanche. C'est le traitement de choix pour la gonorrhée, l'inflammation pelvienne et l'épididymite.

Avisez le médecin, l'infirmière praticienne ou l'infirmière des situations suivantes si vous:

- êtes allergique aux céphalosporines, la lidocaine et d'autres antibiotiques
- si vous allaitez ou êtes enceinte
- prenez des médicaments ou avez récemment reçu le vaccin typhoïdique ou le BCG

Effets secondaires possibles:

- Diarrhée, nausée, vomissements ou maux de tête.

Administration du médicament:

- Vous recevez une injection intramusculaire dans la hanche.
 - Pour réduire la douleur on mélange la médication avec de la lidocaine un anesthésique.
- Après avoir reçu les injections, vous devez attendre **15 minutes** avant de quitter.

Réduction de la douleur au point d'injection:

- Appliquez des compresses chaudes ou froides (15 minutes à la fois); prenez un bain chaud.

Précautions à prendre après la prise de ce médicament:

- Vous ne devez pas avoir de relations sexuelles durant les 7 jours suivant le traitement, même avec un condom.
- Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités.
- Consultez votre médecin si après l'injection vous développez :
 - Maux de ventre sévères et douleur au dos, étourdissements, faiblesse, fièvre
 - Urine foncée, jaunissement de la peau et des yeux
 - Diarrhée (liquide ou avec présence de sang)
- Avisez un membre du personnel ou cherchez à obtenir des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants: éruptions cutanées, démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge.

Pour plus de renseignements, appelez la clinique santé-sexualité 613-234-4641

