



Valacyclovir (Valtrex®)

Cette médication est prise par la bouche pour traiter l'herpès.

Avisez le médecin ou l'infirmière praticienne ou l'infirmière des situations suivantes

- Vous êtes valacyclovir, acyclovir, or famcyclovir;
- Vous prenez des médicaments;
- Vous avez récemment reçu ou planifiez prendre le vaccin Herpès Zoster;
- Vous avez des antécédents de maladie hépatique ou rénale;
- Si vous allaitez

Effets secondaires possibles

- Maux de tête, fatigue ou douleurs abdominales
- Nausée ou vomissements

Prise du médicament

- Cette médication est plus efficace si elle est débutée dans les 24 à 72 heures de l'épisode
- Prenez cette médication avec beaucoup d'eau, avec ou sans nourriture
- Prenez la médication tel que prescrit
- Veuillez compléter votre traitement
- Si vous oubliez un comprimé, prenez-le dès que possible, à moins que ce soit le moment de prendre la dose suivante.

Précautions à prendre après la prise de ce médicament

- Cherchez des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants après avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge.

Précaution pour les femmes

- Cette médication devrait être prise seulement si nécessaire durant la grossesse

Conservation

- Il doit être conservé à la température ambiante et tenu hors de la portée des enfants et des animaux.

Pour plus de renseignements, appelez la clinique santé-sexualité 613-234-4641

