



Vaccin contre le virus du papilloma humain (GARDASIL®4/GARDASIL®9)

Ce vaccin contribue à vous protéger contre les infections qui produisent des verrues génitales et/ou des lésions anormales et précancéreuses. Il est administré par injection. Vous recevrez 3 doses du vaccin sur une période de 6 mois, (première dose, deuxième dose à 2 mois et troisième dose 6 mois après la première dose)

Aviser le médecin ou l'infirmière / l'infirmière praticienne des situations suivantes si vous :

- êtes allergique au vaccin Gardasil ou les composantes du vaccin;
- êtes allergique à la levure;
- êtes enceinte ou allaité.

Effets secondaires possibles

- Rougeur, douleur et enflure au site d'injection
- Nausée, maux de tête, étourdissement et/ou fièvre
- Évanouissement reliée à l'anxiété ressentie lors de l'administration de l'injection

Précautions à prendre après la vaccination

- Cherchez des soins médicaux d'urgence si vous souffrez des symptômes suivants après avoir reçu ce vaccin: démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la gorge.
- Contacter la clinique si vous présentez des effets secondaires reliés à la vaccination.

Conservation du vaccin

- Entreposer le vaccin au réfrigérateur entre 2°C et 8°C. Ne pas le congeler, ni l'exposer à la lumière.
- Le vaccin GARDASIL® 4 / GARDASIL® 9 doit être administré le plus tôt possible après l'avoir retiré du réfrigérateur.
- Le vaccin peut être administré seulement si :
 - la période de temps totale à l'extérieur du réfrigérateur ne dépasse pas 72 heures;
 - le vaccin a été exposé à une température ambiante entre 8°C et 25°C durant cette période de 72 heures hors du réfrigérateur.

Pour plus de renseignements, appelez la clinique santé-sexualité 613-234-4641

